

Kartoffeln

Speisesorte
Reifegruppe

Züchter
Abstammung
Aufnahme in die Sortenliste

Vertreter

Annabelle

früh/précoce


HZPC B.V., NL-8500 AB Joure
Nicola x Monalisa
2008

swissem
Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
Association suisse des producteurs
de semences
1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation
Maturité

Obtenteur
Ascendance
Inscription
sur la liste suisse
Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	lang bis langoval
	Grösse:	mittel bis kleinfallend
	Augen:	flach bis mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	grün bis hellgrün	
Blüten	weiss, klein, sehr selten blühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	longue à oblongue
	taille:	moyenne à petite
	yeux:	superficiels à mi-superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	de taille moyenne, port mi-dressé, avec légère pigmentation	
Feuille	vert à vert clair	
Fleur	blanche, petite, floraison très rare	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	mittel
Kalibrierungsbeute:	niedrig
Stärkegehalt:	niedrig (10-13%)
Stärkeertrag:	niedrig
Kochtyp:	A-B
Verfärbung	
roh:	mittel
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	hoch
	(2,73% TS)
Verarbeitungseignung:	keine
Vorkeimdauer:	4 Wochen

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig
	Pathotyp Ro ₁ bis Ro ₃
Krautfäule:	hoch
Braunfäule:	mittel
Flachschorf:	mittel
Pulverschorf:	gering bis mittel
Eisenfleckigkeit:	gering
Blattroll:	gering
Virus Y:	mittel
Virus Y ^{NTN} :	anfällig
Schlagempfindlichkeit:	gering
Abkeimungs- empfindlichkeit:	hoch

4. Besondere Hinweise

Annabelle hat eine sehr kurze Keimruhe.

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

<i>Rendement:</i>	<i>moyen</i>
<i>Calibre commercial:</i>	<i>faible</i>
<i>Teneur en amidon:</i>	<i>faible (10-13%)</i>
<i>Rendement amidon:</i>	<i>faible</i>
<i>Type culinaire:</i>	<i>A-B</i>
<i>Altération de la couleur</i>	
<i>chair crue:</i>	<i>moyenne</i>
<i>chair cuite:</i>	<i>faible</i>
<i>Sucres réducteurs</i>	<i>élevée</i>
<i>(teneur):</i>	<i>(2,73% MS)</i>
<i>Utilisation technologique:</i>	<i>néant</i>
<i>Prégermination:</i>	<i>4 semaines</i>

3. Sensibilités

<i>Galle verruqueuse:</i>	<i>résistante</i>
<i>Nématodes:</i>	<i>résistante</i>
	<i>aux pathotypes Ro₁ à Ro₃</i>
<i>Mildiou des fanes:</i>	<i>élevée</i>
<i>Mildiou des tubercules:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Gale commune:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Gale poudreuse:</i>	<i>faible à moyenne</i>
<i>Taches de rouille:</i>	<i>faible</i>
<i>Virus de l'enroulement:</i>	<i>faible</i>
<i>Virus Y:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Virus Y^{NTN}:</i>	<i>sensible</i>
<i>Sensibilité aux chocs:</i>	<i>faible</i>
<i>Sensibilité à l'égermage:</i>	<i>élevée</i>

4. Remarques particulières

Annabelle a une dormance très courte.

Annabelle ist eine frühabreifende, festkochende Speisesorte mit guter äusserer Knollenqualität.

Annabelle est une excellente variété de consommation à chair ferme de type précoce.